DCM

OLEGA® COMPLEX

NPK 6-3-4 + B + Cu + Fe + Mn + Mo + Zn

BLADVOEDING
met sporenelementen en zeewierextract

ENGRAIS FOLIAIRE
avec oligo-éléments et extrait d'algues marines

FOLIAR FERTILISER
with trace elements and seaweed extract

BLATTDÜNGER
mit Spurenelementen und Meeresalgenextrakt

added TRACE ELEMENTS

Fe

5 L (6 kg)
netto - nette
nett

DOSIS

sier- en groentegewassen:
3 - 8 ml/L water, drip-off
gras:
300 - 400 ml/10 L water/100 m²

DOSE

plantes ornementales et légumières :
3 - 8 ml/L d'eau, jusqu'au gouttage
gazon :
300 - 400 ml/10 L d'eau/100 m²


DOSAGE

ornamental plants and vegetables:
3 - 8 ml/L water, dripp-off
lawn:
300 - 400 ml/10 L water/100 m²

AUFWANDMENGE

Zier- und Gemüsepflanzen:
3 - 8 ml/L Wasser, bis Tropfen gebildet werden
Rasen:
300 - 400 ml/10 L Wasser/100 m²

5 413448 031300



DE CEUSTER MESTSTOFFEN N.V./S.A.
Bannerlaan 79 - 2280 Grobbendonk - Belgium
Tel. +32(0)14/25.73.57 • e-mail: dcm@dcm-info.com
www.dcm-info.com

5003355 - V8037

DCM OLEGA® COMPLEX

GEBRUIKSAANWIJZING

Nederlands

Toepassen in het actieve groeiseizoen (lente - zomer), zodra de planten goed in blad staan. Bij voorkeur toepassen in de late namiddag tot vooravond, uit de zon, op licht vochtige planten. Bus schudden voor gebruik. Correcte verdunning maken van water en meststof en gelijkmatig verspuiten over het blad tot afdruipen (drip-off). Minimaal 2, bij voorkeur 3 toepassingen, telkens met 10 dagen tussentijd. De mate en snelheid van de respons van de plant zijn afhankelijk van de plantensoort en variëteit, het groeistadium en de klimaatomstandigheden.

- groene, niet-bloeiende struiken, hagen, coniferen ..... 8 ml/L water
- bloeiende struiken en siergewassen
  - voor het openen van de bloemknoppen ..... 8 ml/L water
  - bij openstaande bloemen ..... 3 ml/L water
- groente- en sierteelt onder glas ..... 5 ml/L water
- gazons en sportvelden ..... 300 - 400 ml/10 L water/100 m²

Vorstvrij bewaren. Product niet eten of drinken. Niet gebruiken als diervoeding. Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren

WAARBORGEN

Meststof - Suspensie van samengestelde meststof NPK 6-3-4 met sporenelementen en zeewierextract

6 % STIKSTOF TOTAAL (N) waarvan 6 % ureumstikstof

3 % FOSFORZUURANHYDRIDE (P_2O_5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
waarvan 3 % fosforzuuranhydride oplosbaar in water

4 % KALIUMOXIDE (K_2O) oplosbaar in water

6 % ZEEWIEREXTRACT

oplosbaar in water:

boor (B):	0,3 %
koper (Cu)*:	0,12 %
ijzer (Fe)**:	0,3 %
mangaan (Mn)*:	0,3 %
molybdeen (Mo):	0,06 %
zink (Zn)*:	0,3 %

* chelaatvormer EDTA, ** chelaatvormer DTPA

Ontheffingsnummer: EM062.DC.

Toegelaten product, op de Belgische markt verkocht onder het ontheffingsnummer EM062.DC, in andere Europese landen op de markt gebracht overeenkomstig Verordening (EU) 2019/515 (wederzijdse erkenning). Nederland: voor de gebruikstoormen telt de stikstof en het fosfaat mee voor 100 %.

MODE D'EMPLOI

Français

Appliquer en période de croissance active (printemps - été), dès que les plantes sont bien en feuilles. Appliquer de préférence vers la fin de l'après-midi ou en début de soirée, quand il n'y a plus de soleil, sur des plantes légèrement humides. Bien agiter le bidon avant l'utilisation. Faire une dilution correcte de l'eau et de l'engrais et pulvériser uniformément sur les feuilles jusqu'au gouttage (drip-off). Au minimum 2 applications, de préférence 3, avec chaque fois un intervalle de 10 jours. L'ampleur et la vitesse de la réaction de la plante dépendent du type de plante et de la variété, du stade de croissance et des circonstances climatologiques.

- arbustes verts (sans fleurs), haies, conifères ..... 8 ml/L d'eau
- arbustes à fleurs et plantes ornementales
  - avant l'ouverture des boutons ..... 8 ml/L d'eau
  - en floraison ..... 3 ml/L d'eau
- culture maraîchère et ornementale sous serre ..... 5 ml/L d'eau
- gazons et terrains de sport ..... 300 - 400 ml/10 L d'eau/100 m²

Conserver à l'abri du gel. Ne pas manger ou boire le produit. Ne pas utiliser comme aliment pour les animaux. Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

GARANTIES

Engrais : Suspension d'engrais composé NPK 6-3-4 avec oligo-éléments et un extrait d'algue

6 % AZOTE TOTAL (N) dont 6 % azote uréique

3 % ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P_2O_5) soluble dans l'eau et le citrate d'ammonium neutre
dont 3 % anhydride phosphorique soluble dans l'eau

4 % OXYDE DE POTASSIUM (K_2O) soluble dans l'eau

6 % EXTRAIT D'ALGUES MARINES

soluble dans l'eau:

bore (B) :	0,3 %
cuivre (Cu)*:	0,12 %
fer (Fe)**:	0,3 %
manganèse (Mn)*:	0,3 %
molybdène (Mo):	0,06 %
zinc (Zn)*:	0,3 %

* chélaté par EDTA, ** chélaté par DTPA

N° de dérogation : EM062.DC.

Produit autorisé, vendu sur le marché belge sous la dérogation numéro EM062.DC, commercialisé dans d'autres pays européens conformément au règlement (UE) 2019/515 (reconnaissance mutuelle).

GARANTIES POUR LA FRANCE

ENGRAIS POUR PULVERISATION FOLIAIRE NF U 42-003-2

Suspension NPK 6-3-4 et bore et cuivre chélaté et fer chélaté et manganèse chélaté et molybdène et zinc chelaté, produit soluble

Teneurs garanties en masse du produit brut:

AZOTE (N) total	6 %
dont azote uréique	6 %
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P_2O_5) soluble dans l'eau	3 %
OXYDE DE POTASSIUM (K_2O) soluble dans l'eau	4 %
ANHYDRIDE SULPHURIQUE (SO_3) soluble dans l'eau	0,25 %

Oligo-éléments: voir garanties ci-dessus.

Engrais contenant un oligo-élément. À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu, ne pas dépasser la dose preconisée. Les doses conseillées, à l'appréciation du responsable de la mise sur le marché, sous réserve qu'elles soient comprises entre les doses limites qui découlent des dispositions de l'article 5 « Doses limites d'emploi ». La quantité maximale cumulée de cuivre à apporter ne devra pas dépasser 100 kg/ha sur 10 ans ; cuivre utilisé sur cultures fourragères : la dose maximale annuelle et de 5 kg/ha.

La quantité maximale annuelle de molybdène à cultures fourragères est de 0,100 kg/ha.

INSTRUCTIONS FOR USE

English

Apply in the active growing season (spring - summer), as soon as the plants are well in leaf. Apply preferably in the late afternoon or early evening, out of the sun, on slightly moist plants. Shake the container before use. Make the correct dilution with water and fertiliser and spray evenly over the leaves until it drips down from the plants (drip-off). Minimum 2, preferably 3 applications, each time with an interval of 10 days. The extent and quickness of response are dependent on the plant type, the variety, the growth stage and the climatic circumstances.

- green, non-blooming shrubs, hedges, conifers ..... 8 ml/L water
- blooming shrubs and ornamental plants
  - before opening of the buds ..... 8 ml/L water
  - in full bloom ..... 3 ml/L water
- vegetable growing and ornamental plant cultivation under glass ..... 5 ml/L water
- lawns and sports turfs ..... 300 - 400 ml/10 L water/100 m²

Store in a frost-free place. Do not eat or drink the product. Do not use as animal feed. Keep out of reach of children and pets.

GUARANTEES

Fertiliser - Suspension of compound fertilisers NPK 6-3-4 with trace elements and seaweed extract

6 % NITROGEN TOTAL (N) of which 6 % urea nitrogen

3 % PHOSPHORUS ANHYDRIDE (P_2O_5) water soluble and neutral ammonium citrate
of which 3 % phosphorus anhydride soluble in water

4 % POTASSIUM OXIDE (K_2O) water soluble

6 % SEAWEED EXTRACT

water-soluble:

boron (B):	0,3 %
copper (Cu)*:	0,12 %
iron (Fe)**:	0,3 %
manganese (Mn)*:	0,3 %
molybdenum (Mo)*:	0,06%
zinc (Zn):	0,3 %

* Chelating agent EDTA, ** Chelating agent DTPA

Derogation number: EM062.DC.

Authorised product, sold on the Belgian market under derogation number EM062.DC, placed on the market in other European countries in accordance with Regulation (EU) 2019/515 (mutual recognition).

ANWENDUNG

Deutsch

In der aktiven Wachstumsperiode (Frühling - Sommer) anwenden, sobald die Pflanzen ausreichend Blätter gebildet haben. Vorzugsweise am späten Nachmittag oder frühen Abend, aus der Sonne, auf leicht feuchten Pflanzen verwenden. Kanister vor der Anwendung schütteln. Die Lösung korrekt zubereiten und gleichmäßig über die Blätter versprühen, bis Tropfen gebildet werden (drip-off). Mindestens 2, vorzugsweise 3 Anwendungen, mit jeweils 10 Tagen Abstand. Wirkung und Reaktionsgeschwindigkeit variieren je nach der Pflanze, der Sorte, dem Wachstumsstadium und den klimatischen Verhältnissen.

- grüne, nicht blühende Sträucher, Hecken, Koniferen ..... 8 ml/L Wasser
- blühende Sträucher und Zierpflanzen
  - vor dem Öffnen der Blütenknospen ..... 8 ml/L Wasser
  - während der Blüte ..... 3 ml/L Wasser
- Gemüse- und Zierpflanzenbau unter Glas ..... 5 ml/L Wasser
- Rasen und Sportrasenflächen ..... 300 - 400 ml/10 L Wasser/100 m^2

Frostfrei lagern. Das Produkt nicht essen oder trinken. Nicht als Tierfutter verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

WARENDEKLARATION FÜR DEUTSCHLAND

Organisch-Mineralischer NPK-Dünger (flüssig) 6-3-4 mit Spurenelementen
Unter Verwendung von Düngemitteln und pflanzlichen Stoffen

6 %	Gesamtstickstoff	(N)	(71,4 g/L)
3 %	Gesamtphosphat	(P_2O_5)	(35,7 g/L)
4 %	Gesamtkaliumoxid	(K_2O)	(47,6 g/L)
0,3 %	Gesamtbor (*)	(B)	(3,6 g/L)
0,12%	Gesamtkupfer (*)	(Cu)	(1,4 g/L)
0,3 %	Gesamteisen (*)	(Fe)	(3,5 g/L)
0,3 %	Gesamtmangan (*)	(Mn)	(3,6 g/L)
0,06 %	Gesamtmolybdän (*)	(Mo)	(0,7 g/L)
0,3 %	Gesamtzink (*)	(Zn)	(3,6 g/L)

pH Bereich EDTA = 4 - 10
pH Bereich DTPA = 3 - 7,5
* = wasserlöslich

Nettomasse: 17,5 kg (15 L)
Inverkehrbringer: Deutsche CUXIN Marketing GmbH, Fürstendiek 8, 48291 Telgte

Ausgangsstoffe: Harnstoff, PK-Dünger, Bor, Kupfer (EDTA), Eisen (DTPA), Mangan (EDTA), Molybdän, Zink Zn (EDTA), Meeresalgenextrakt
Nebenbestandteile:
6 % Carbamidstickstoff (71,4 g/L)
35 % Organische Substanz i. F.M.
Hinweise zur sachgerechten Lagerung: Bei kühler und trockener Lagerung sind keine Veränderungen der Produkteigenschaften zu erwarten. In der Originalverpackung trocken, kühl, frostfrei lagern. Anbruchpackung gut verschließen. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Eine Lagerung muß so erfolgen, dass es nicht zu Abtragungen in Oberflächengewässer oder in das Grundwasser kommen kann.
Hinweise zur sachgerechten Anwendung: Empfehlungen der amtlichen Beratung gehen vor. Keine Mischung mit Futtermitteln.
Anwendungsbereich: Zur Düngung im GaLaBau, Gemüseanbau, Baumschule, Golf- und Sportanlage, Haus- und Kleingarten
Sicherheitshinweis: Nach der Anwendung Hände und eventuell anders berührte Hautstellen gründlich waschen. Nicht zum Verzehr geeignet.

für Österreich

Ergänzung für Österreich: Organisch-mineralischer Dünger flüssig

6 % Gesamtstickstoff	(N)	(71,4 g/L)
3 % Gesamtphosphat	(P_2O_5)	(35,7 g/L)
4 % Gesamtkaliumoxid	(K_2O)	(47,6 g/L)

50 % Organische Substanz i. T.S.
Inverkehrbringer: Deutsche CUXIN Marketing GmbH, Fürstendiek 8, D-48291 Telgte