DCM

OLEGA® FER

3 % N + 3 % Fe

BLADVOEDING
met planteigen ijzer(Fe)complex en zeewierextract

ENGRAIS FOLIAIRE
avec complexe ferrique (Fe) propre à la plante
et avec extrait d'algues marines

FOLIAR FERTILISER
with plant own iron (Fe) complex and seaweed extract

BLATTDÜNGER
mit pflanzeneigenem Eisen (Fe)-komplex und Meeresalgenextrakt

added TRACE ELEMENTS FC

5 L (5,5 kg)
netto - nette
nett

DOSIS

1 - 7 L/400 L water/ha

4 - 15 ml/L water; drip-off

DOSE

1 - 7 L/400 L eau/ha

4 - 15 ml/L eau , jusqu'au gouttage

DOSAGE

1 - 7 L/400 L water/ha


4 - 15 ml/L water, dripp-off

AUFWANDMENGE

1 - 7 L/400 L water/ha

4 - 15 ml/L water; drip-off

5 413448 031317



DE CEUSTER MESTSTOFFEN N.V. / S.A.
Bannerlaan 79 - 2280 Grobbendonk - Belgium
Tel. +32(0)14/25.73.57 • e-mail: dcm@dcm-info.com
www.dcm-info.com

5003359 - V8039

DCM OLEGA® FER

GEBRUIKSAANWIJZING

Nederlands

Bij voorkeur preventief gebruiken, tijdens het actieve groeiseizoen (lente - zomer), zodra de planten goed in blad staan. Bij voorkeur toepassen in de late namiddag tot vooravond, indien mogelijk op licht vochtige planten. Niet toepassen in volle zon en bij temperaturen hoger dan 25 °C. Niet toepassen op geopende bloemen. Bus schudden voor gebruik. Correcte verdunning maken van de meststof in water en deze oplossing verspuiten over het blad tot afdruipen (drip-off). De mate en snelheid van de respons van de plant zijn afhankelijk van de plantensoort en variëteit, het groeistadium en de klimaatomstandigheden: voer de eerste toepassing daarom altijd uit met de laagst aangegeven dosis. Bij gebruik van een uitvloeier de concentratie van 10 ml/L water niet overschrijden.

fruitbomen (o.a. peren), meerjarige, houtige struiken en bomen ..... 1,5 - 7 L/min. 400 L water/ha
min. 2, bij voorkeur 3 toepassingen in functie van de noodzaak met 10 - 14 dagen tussentijd. Bij sterk ijzergebrek curatief 4 - 7 L/min. 400 L water/ha.

éénjarige planten en bloemen, groenten en kruiden ..... 1 - 4 L/min. 400 L water/ha
min. 2, bij voorkeur 3 toepassingen in functie van de noodzaak met 10 - 14 dagen tussentijd. Bij sterk ijzergebrek curatief 2 - 4 L/min. 400 L water/ha. Bij serreteelten max. 2,4 L/min. 400 L water/ha.

gazons en grassportvelden
- standaarddosis ..... 7 - 10 L/min. 400 L water/ha
min. 3, bij voorkeur 5 toepassingen in functie van de noodzaak met 10 - 14 dagen tussentijd
- snelle groenkleuring ..... 40 - 60 L/min. 1000 L water/ha

toepassingen in tuinaanneming en op kleine oppervlakten
- meerjarige, houtige struiken en bomen ..... 8 - 15 ml/L water
- éénjarige planten en bloemen ..... 4 - 6 ml/L water

Vorstvrij bewaren. Product niet eten of drinken. Niet gebruiken als diervoeding. Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren.

WAARBORGEN

Meststof
Oplossing van meststoffen op basis van ijzer (Fe) met zeewierextract voor bladbemesting
3 % IJZER (Fe) oplosbaar in water waarvan
2 % ijzer (Fe) gecomplexeerd door citraat
1 % ijzer (Fe) gechelateerd door DTPA
3 % UREUMSTIKSTOF
3 % ZEEWIEREXTRACT
Ontheffingsnummer: EM062.DE.
Toegelaten product, op de Belgische markt verkocht onder het ontheffingsnummer EM062.DE, in andere Europese landen op de markt gebracht overeenkomstig Verordening (EU) 2019/515 (wederzijdse erkenning). Nederland: voor de gebruiksnormen telt de stikstof mee voor 100 %.

MODE D'EMPLOI

Français

Utiliser de préférence à titre préventif, en période de croissance active (printemps - été), dès que les plantes sont bien en feuilles. Appliquer de préférence vers la fin de l'après-midi ou en début de soirée, si possible sur des plantes légèrement humides. Ne pas appliquer en plein soleil et à des températures supérieures à 25 °C.
Ne pas utiliser sur des fleurs ouvertes. Bien agiter le bidon avant l'utilisation. Faire une dilution correcte d'eau et d'engrais et pulvériser uniformément sur la feuille jusqu'au gouttage (drip-off). L'ampleur et la vitesse de la réaction de la plante dépendent du type de plante et de la variété, du stade de croissance et des circonstances climatologiques : pour la première application, utilisez donc toujours la dose la plus basse. En combinaison avec un agent mouillant, ne pas dépasser la concentration de 10 ml/L d'eau.

arbres fruitiers (p.ex. poiriers), arbres et arbustes ligneux pluriannuels ..... 1,5 - 7 L/min. 400 L d'eau/ha
au moins 2, de préférence 3 applications en fonction des besoins à 10 - 14 jours d'intervalle. Lors d'une forte carence en fer, et à titre curatif 4 - 7 L/min. 400 L d'eau/ha.

plantes et fleurs annuelles, légumes et plantes aromatiques ..... 1 - 4 L/min. 400 L d'eau/ha
au moins 2, de préférence 3 applications en fonction des besoins à 10 - 14 jours d'intervalle. Lors d'une forte carence en fer, et à titre curatif 2 - 4 L/min. 400 L d'eau/ha. Pour les cultures sous serres, max. 2,4 L/min. 400 L d'eau/ha.

gazons et terrains de sport engazonnés
- dose standard ..... 7 - 10 L/min. 400 L d'eau/ha
au moins 3, de préférence 5 applications en fonction des besoins à 10 - 14 jours d'intervalle
- verdissement rapide ..... 40 - 60 L/min. 1000 L d'eau/ha

applications dans l'aménagement de jardin et sur des surfaces réduites
- arbres et arbustes ligneux pluriannuels ..... 8 - 15 ml/L d'eau
- plantes et fleurs annuelles ..... 4 - 6 ml/L d'eau

Conserver à l'abri du gel. Ne pas manger ou boire le produit. Ne pas utiliser comme aliment pour les animaux. Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

GARANTIES

Engrais
Solution d'engrais à base de fer (Fe) avec extraits d'algues marines pour la fertilisation foliaire
3 % FER (Fe) soluble dans l'eau dont
2 % fer (Fe) complexé par citrate
1 % fer (Fe) chelaté par DTPA
3 % AZOTE URÉIQUE
3 % EXTRAIT D'ALGUES MARINES
N° de dérogation : EM062.DE.
Produit autorisé, vendu sur le marché belge sous la dérogation numéro EM062.DE, commercialisé dans d'autres pays européens conformément au règlement (UE) 2019/515 (reconnaissance mutuelle).

GARANTIES POUR LA FRANCE

ENGRAIS POUR PULVÉRISATION FOLIAIRE NF U 42-003-2
Solution d'engrais et de fer (chelaté et citrate) liquide pour pulvérisation
Teneurs garanties en masse du produit brut :
AZOTE (N) total ..... %
dont azote uréique ..... %
FER (Fe) total ..... %
fer chelaté par DTPA ..... %
fer complexé par citrate ..... %
Engrais contenant un oligo-élément. À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu, ne pas dépasser la dose préconisée. Les doses usuelles à la préciation du responsable de la mise sur le marché, sous réserve qu'elles soient comprises entre les doses limites qui figurent à la rubrique de l'article 5 « Doses limites d'emploi ».

INSTRUCTIONS FOR USE

English

It is preferable to apply preventively in the active growing season (spring - summer), as soon as the plants are well in leaf. Apply preferably in the late afternoon or early evening, on slightly moist plants; do not apply in the blazing sun and at temperatures above 25 °C. Do not apply on opened flowers. Shake the container well before use. Make the correct dilution with water and spray evenly over the leaves until it drips down from the plants (drip-off). The extent and quickness of response are dependent on the plant type, the variety, the growth stage and the climatic circumstances; therefore always use the lowest dosage during the first application. In combination with a wetting agent, do not exceed the concentration of 10 ml/L water.

fruit trees (f.i. pears), perennial, woody shrubs and trees ..... 1,5 - 7 L/min. 400 L water/ha
according to necessity, minimum 2, preferably 3 applications with an interval of 10 - 14 days. In case of severe iron deficiency curatively 4 - 7 L/min. 400 L water/ha

annual plants and flowers, vegetables and herbs ..... 1 - 4 L/min. 400 L water/ha
according to necessity, minimum 2, preferably 3 applications with an interval of 10 - 14 days. In case of severe iron deficiency curatively 2 - 4 L/min. 400 L water/ha. For crops under glass max. 2,4 L/min. 400 L water/ha.

lawns and sports turfs
- standard dosage ..... 7 - 10 L/min. 400 L water/ha
according to necessity, minimum 3, preferably 5 applications with an interval of 10 - 14 days
- fast greening response ..... 40 - 60 L/min. 1000 L water/ha

applications in landscaping and on small surfaces
- perennial, woody shrubs and trees ..... 8 - 15 ml/L water
- annual plants and flowers ..... 4 - 6 ml/L water

Store in a frost-free place. Do not eat or drink the product. Do not use as animal feed. Keep out of reach of children and animals.

GUARANTEES

Fertiliser
Solution of fertilisers with iron and seaweed extract for foliar fertilization
3 % IRON (Fe) soluble in water of which
2 % iron (Fe) complexed by citrate
1 % iron (Fe) DTPA chelated
3 % UREIC NITROGEN
3 % SEAWEED EXTRACT
Derogation number: EM062.DE.
Authorised product, sold on the Belgian market under derogation number EM062.DE, marketed in other European countries in accordance with Regulation (EU) 2019/515 (mutual recognition).

Die Lösung vorzugsweise präventiv in der aktiven Wachstumsperiode (Frühling - Sommer) anwenden, sobald die Pflanzen ausreichend Blätter gebildet haben. Die Lösung vorzugsweise am späten Nachmittag oder frühen Abend, auf leicht feuchten Pflanzen verwenden. Die Lösung nicht in praller Sonne und bei Temperaturen über 25 °C verwenden; die Lösung nicht auf geöffneten Blüten ausbringen. Kanister vor der Anwendung gut schütteln. Die Lösung korrekt zubereiten und gleichmäßig über die Blätter versprühen, bis Tropfen gebildet werden (drip-off). Wirkung und Reaktionsgeschwindigkeit variieren je nach der Pflanze, der Sorte, dem Wachstumsstadium und den klimatischen Verhältnissen: verwenden Sie bei der ersten Anwendung deshalb immer die niedrigste Aufwandmenge. In Kombination mit einem Benetzungsmittel, die Konzentration von 10 ml/L Wasser nicht überschreiten.

Obstbäume (u.a. Birnen), mehrjährige Holzgewächse und Bäume ..... 1,5 - 7 L/min. 400 L Wasser/ha
mindestens 2, vorzugsweise 3 Anwendungen je nach Bedarf, mit jeweils 10 - 14 Tagen Abstand. Bei einem starken Eisenmangel, kurativ 4 - 7 L/min. 400 L Wasser/ha

Einjährige Pflanzen und Blumen, Gemüse und Kräuter ..... 1 - 4 L/min. 400 L Wasser/ha
mindestens 2, vorzugsweise 3 Anwendungen je nach Bedarf, mit jeweils 10 - 14 Tagen Abstand Bei einem starken Eisenmangel, kurativ 2 - 4 L/min. 400 L Wasser/ha. Für Pflanzen im Gewächshaus max. 2,4 L/min. 400 L Wasser/ha.

Rasen- und Sportrasenflächen
- Standardaufwandmenge ..... 7 - 10 L/min. 400 L Wasser/ha
mindestens 3, vorzugsweise 5 Anwendungen je nach Bedarf, mit jeweils 10 - 14 Tagen Abstand
- schnelle Grünfärbung ..... 40 - 60 L/min. 1000 L Wasser/ha

Anwendungen im GaLaBau und auf kleinen Flächen
- mehrjährige Holzgewächse und Bäume ..... 8 - 15 ml/L Wasser
- einjährige Pflanzen und Blumen ..... 4 - 6 ml/L Wasser

Frostfrei lagern. Das Produkt nicht essen oder trinken. Nicht als Tierfutter verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

WARENDEKLARATION FÜR DEUTSCHLAND

Organisch-mineralischer N-Dünger 3 (flüssig) mit Eisen
Unter Verwendung von Düngemitteln und pflanzlichen Stoffen

3 %	Gesamtstickstoff	(N)	(33,8 g/L)
3 %	Gesamteisen	(Fe) (wasserlöslich, 2% als Chelat von DTPA)	(33,8 g/L)

pH Bereich DTPA: 3-7,5
Nettomasse: 16,5 kg (15 L)
Inverkehrbringer: Deutsche CUXIN Marketing GmbH, Fürstendiek 8, 48291 Telgte

---

Ausgangsstoffe: Harnstoff, Eisen (Eisenammoniumzitrat, Eisenchelat DTPA), Meeresalgenextrakt
Nebenbestandteile:
3 % Carbamidstickstoff (33,8 g/L)
35 % Organische Substanz i. F.M.

Hinweise zur sachgerechten Lagerung: Bei kühler und trockener Lagerung sind keine Veränderunge
n der Produkteigenschaften zu erwarten. In der Originalverpackung trocken, kühl, frostfrei lagern. Anbruchpackung gut verschließen. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Eine Lagerung muß so erfolgen, dass es nicht zu Abtragungen in Oberflächengewässer oder in das Grundwasser kommen kann.

Hinweise zur sachgerechten Anwendung: Empfehlungen der amtlichen Beratung gehen vor. Keine Mischung mit Futtermitteln.

Anwendungsbereich: Zur Düngung im GaLaBau, Gemüseanbau, Baumschule, Golf- und Sportanlage, Haus- und Kleingarten

Sicherheitshinweis: Nach der Anwendung Hände und eventuell anders berührte Hautstellen gründlich waschen. Nicht zum Verzehr geeignet.

für Österreich

Ergänzung für Österreich: Organisch-mineralischer Dünger (flüssig)

3 %	N Gesamtstickstoff	(33,8 g/L)
3 %	Carbamidstickstoff	(33,8 g/L)
3 %	Gesamteisen (Fe) (wasserlöslich, 2% als Chelat von DTPA)	(33,8 g/L)
70 %	Organische Substanz i. T.S.	

Inverkehrbringer: Deutsche CUXIN Marketing GmbH, Fürstendiek 8, D-48291 Telgte